

## Биологически активная добавка к пище «Эхинацея в таблетках»

### Чем полезна эхинацея?

Эхинацея имеет сложный химический состав.

В экстракте эхинацеи содержится множество биологически активных веществ: флавоноиды, витамины А и С, полисахариды, эфирные масла, органические кислоты.

Основным веществом, которое обуславливает полезные свойства эхинацеи, являются гидроксикоричные кислоты.

Гидроксикоричные кислоты оказывают иммуностимулирующее и противовоспалительное действие.

Прием экстракта эхинацеи пурпурной способствует нормализации работы иммунной системы и усилению защитных возможностей организма.

### Как правильно принимать средства на основе эхинацеи?

- Начинать прием средств на основе эхинацеи желательно заранее, до наступления пика простудных заболеваний и гриппа. Вероятность заболеть или заразиться зависит от состояния иммунитета. Чтобы отражать частые атаки болезнетворных микроорганизмов осенью и зимой, иммунная система должна постоянно находиться в активном состоянии. Поэтому вполне естественно готовить иммунитет к предстоящей нагрузке перед сезонным пиком простудных заболеваний.

- Длительность курса приема – от 1 до 4 недель. Укрепит иммунитет за один день едва ли возможно, но и продолжать стимулировать иммунитет, когда организм уже готов к борьбе с инфекцией, нецелесообразно.

- Средства на основе эхинацеи обычно принимают несколько раз в день, поскольку действие гидроксикоричных кислот длится недолго.

### «Эхинацея в таблетках»

- Обеспечивает 90-120 % от адекватной потребности организма в гидроксикоричных кислотах.

- Удобна в применении – можно брать с собой на работу, учебу и т.д.

- Одной упаковки достаточно для проведения минимального курса (1 неделя).

**Форма выпуска:** 25 таблеток средней массой по 210 мг.

**Состав:** *подсластитель:* сорбит Е420; экстракт эхинацеи пурпурной; *антислёживающие агенты:* магния стеарат Е470, диоксид кремния аморфный Е551; *ароматизатор* «Смородина», *подсластитель:* сукралоза Е955.

*Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.*

**Область применения:** рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - источника гидроксикоричных кислот.

**Рекомендации по применению:** взрослым, по 1 таблетке 3-4 раза в день во время еды.

Продолжительность приема - от 1 до 4 недель.

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

**Реализация:** через аптечные учреждения, специализированные магазины по продаже диетических продуктов, специальные отделы продовольственных магазинов.

**Не является лекарством.**

**Срок годности:** 3 года.

**Содержание активных веществ в 4 таблетках:**

Наименование компонента	Содержание	% от адекватного уровня потребления*
Гидроксикоричные кислоты, не менее	12 мг	120**

СГР № RU.77.99.11.003.E.003461.08.18  
от 13.08.2018 г.

TU 9197-002-54863068-14 с изм. № 1

**Изготовитель:** ООО «ВТФ», РФ, 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 107.

**Организация, уполномоченная на принятие претензий в Республике Казахстан:**  
ТОО «Pharmaline», 050016, г. Алматы, ул. Шамиевой, д. 11.  
Тел.: +7 (727) 338 48 14, +7 (727) 338 48 15.

\* - согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».  
\*\* - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

Все права на продукт принадлежат ООО «ВТФ».